

A. BELKHIRI
F. DALIA.

DROGUIER VIRTUEL

Absinthe (*Artemisia absinthium*, ASTERACEAE), feuilles et fleurs , huile essentielle : eupeptique, stimulant l'appétit, tonique général mais huile essentielle TOXIQUE (Thuyones, neurotoxique)



Aubépine, (*Crataegus monogyna*, *C. laevigata*=*oxyacantha*, ROSACEAE), fleurs, bourgeons, teinture-mère : sédative, éréthisme cardiaque et neurotonie



Badiane de Chine, (*Illicium verum* - ILLIACEAE), fruit : dyspepsies, colites



Brosse à dents africaine, (*Zanthoxylum zanthoxyloides*, Syn. *Fagara zanthoxyloides* , RUTACEAE). antimicrobiens (antibacterien)




Boldo, (*Pneumus boldus* - MONIMIACEAE), feuille : dyspeptiques d'origine hépatique, anti-inflammatoire



Cadier, (*Juniperus oxycedrus* - CUPRESSACEAE), bois (huile de cade):
dermatologie, cosmétologie



Caféier, (*Coffea arabica*, *Coffea canephora* - RUBIACEAE), graine : stimulant



Cannelier, (*Cinnamomum zeylicanum*, *Cinnamomum cassia* - LAURACEAE),
écorce, huile essentielle : épice, stimulant digestif, antiseptique digestif, biliaire,
cutané, dermatologie



Caroubier, (*Ceratonia siliqua* - CAESALPINIACEAE) , graines : mucilage, colopathies, régime amaigrissant, industrie pharmaceutique et agroalimentaire



Cerisier, (*Prunus cerasus* - ROSACEAE), pédoncule du fruit : diurétique, anti-inflammatoire



Coloquinte (*Colocynthis vulgaris*, syn. *Citrullus colocynthis* – CUCURBITACEAE),
hypoglycémiant, purgatif drastique, TOXIQUE



Coquelicot, (*Papaver rhoeas* - PAPAVERACEAE) , pétales : sédatif léger, neurotonie



Coriandre, (*Coriandrum sativum* - APIACEAE), fruit, huile essentielle : régulateur de la digestion, anti-dyspeptique, antidépresseur



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri, Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Cresson alénois, (*Lepidium sativum* - CRUCIFERAE), Graine, Panacée en médecine traditionnelle du Maghreb



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri, Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Cyprès, (*Cupressus sempervirens* - CUPRESSACEAE), cones femelles, teinture mère : protection veino-lymphatique (hémorroïdes), énurésie



Datura, (*Datura stramonium* - SOLANACEAE), feuilles : source d'alcaloïdes (scopolamine, atropine), TOXIQUE



Eucalyptus, (*Eucalyptus globulus* - MYRTACEAE), feuilles, huile essentielle : antiseptique (notamment des voies respiratoires), antidiabétique



Fenouil, (*Foeniculum vulgare* - APIACEAE), fruit, huile essentielle : dyspeptie, liquoristerie



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri , Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Fenugrec, (*Trigonella foenum graecum* - FABACEAE), graine : antidiabétique, hypocholestérolémiant, hypolipémiant, facilite la prise de poids

Figuier de Barbarie, (*Opuntia ficus indica* - CACTACEAE), Fleur, Pectorale, émollient, laxatif à effet de lest



Galanga, (*Alpinia officinarum* - ZINGIBERACEAE), Rhizome :stimulante, carminative, stomachique, tonique digestif



Genévrier de Phénicie , (*Juniperus Phoenica* – CUPRESSACEAE), feuille+ fruit,
stomachique, TOXIQUE



Gingembre, (*Zingiber officinalis*, ZINGIBERACEAE), rhizome : cholagogue, stimulant digestif, hépatoprotecteur, antinauséeux (antiémétique)



Globulaire, (*Globularia alypum*, - GLOBULARIACEAE), Feuille, laxatif, troubles digestifs, stimulant de l'appétit, hypoglycémiant.



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri, Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Grenadier, (*Punica granatum*, PUNICACEAE), fruit , racine : astringent, source de Vitamine C, antiparasitaire intestinal



Harmel , (*Peganum harmala* , ZYGOPHYLLACEAE), Fruit, antirhumatisme,
TOXIQUE



Jujubier sauvage , (*Zizyphus lotus*, Rhamanaceae), Feuille : Ictère; fruit : pectorale et émollient.



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri , Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Jusquiamе, (*Hyoscyamus niger*, *Hyoscyamus muticus*, SOLANACEAE), feuilles :
TOXIQUE, alcaloides parasympatholytiques (hyoscyamine, atropine, scopolamine)



- Hibiscus (*Hibiscus rosa-sinensis*) MALVACEAE, fleurs : émollient, adoucissant mucilagineux



Laurier rose, (*Nerium oleander*, APOCYNACEAE), feuilles, latex, bois :
cardiotonique, TOXIQUE



Lavandes, lavande vraie : [*Lavandula angustifolia* (= *Lavandula officinalis* , L. vera) ; lavande aspic, (= *Lavandula latifolia* , *L. spicata*), LABIATEAE], fleurs séchée, huile essentielle : antiseptique, antidépresseur, antispasmodique, sédative, diurétique



Lentisque , (*Pistacia lentiscus*, ANACARDIACEAE), Huile médicinale (obtenue des fruits murs) : cicatrisant, anti-allergique



Lin, (*Linum usitatissimum* -LINACEAE) , graine : laxatif mucilagineux et par effet de lest, pansement digestif, emmolient



Marjolaine, (*Thymus majorana* -LAMIACEAE), Sommité fleurie, Stomachique, Digestif, Décongestionnant du nez bouché, de rhume (inhalation), hygiène buccale (bain de bouche)



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri , Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Marrube blanc, (*Marrubium vulgare* -LAMIACEAE), sommité fleurie : affections bronchiques et des voies respiratoires supérieures



Matricaire ou camomille allemande (*Chamomilla recutita*, Syn.: *Matricaria chamomilla*, ASTERACEAE) , capitule (fleurs) desséché, huile essentielle : anti-inflammatoire, antispasmodique, troubles digestifs mineurs, adoucissant antiprurigineux et trophique en dermatologie, cosmétologie et parfumerie



Mauve, (*Malva sylvestris* - MALVACEAE), Fleurs , Pectorale, émollient



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri , Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Muscade, (*Myristica fragrans* - MYRISTICACEAE), noix, fruit , huile essentielle :
antibactérien, anti-inflammatoire, tonique, TOXIQUE




Myrte, (*Myrtus communis* - MYRTACEAE), feuilles, fruit : antiseptique respiratoire et urinaire, antiseptie cutanée



Nigelle, (*Nigella sativa* - RENUNCULACEAE) : antihistaminique, antimigraineux



Olivier, (*Olea europea* - OLEACEAE), fruit, feuilles, jeunes rameaux : hypotenseur, antidiabétique ; huile médicinale : laxatif lubrifiant, hypocholestérolémiant



Passiflore, (*Passiflora incarnata*, *P. caerulea* - PASSIFLORAE), Feuilles + fleurs,
Neurosédatif et tranquillisant,



Piment de Cayenne, (*Capsicum frutescens* - SOLANACEAE), fruit : source de vitamine C, stomachique, tonique, révulsif



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri, Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Pins, (*Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, et autres pins - PINACEAE), écorce, veinotonique et vasculoprotecteur



Poivre noir, (*Piper nigrum* - PIPERACEAE), fruit : épice stomachique, sédatif, médecine ayurvédique



Pyrèthre d'Afrique , (*Anacyclus pyrethrum* - ASTERACEAE), Racine : Sialogogue, Calmant dentaire, Rubéfiant, Antirhumatisme.

Réglisse, (*Glycyrrhiza glabra* - FABACEAE), racine : anti-inflammatoire, anti-ulcéreux gastrique, antidyspeptique, aromatisant, immunostimulant, antiviral



Ricin (*Ricinus communis* - EUPHORBIACEAE), feuille, graine :, source d'huile industrielle, purgatif drastique, anticancéreux TOXIQUE



Romarin, (*Rosmarinus officinalis* - LAMIACEAE), feuilles, huile essentielle :
bactéricide, spasmolytique, stimulant digestif, cholagogue, hépatoprotecteur,
diurétique, antioxydant



PARONYQUE ARGENTÉE (*Paronychia argentea* – CARYOPHYLLACEAE)

Diurétique, Antilithasique (calculs rénaux)



Sauge (*Salvia officinalis* -LABIATEAE), feuilles, huile essentielle : antispasmodique digestif, tonique, stimulant, emménagogue (action folliculine-like), huile essentielle TOXIQUE (Thuyones, Neurotoxique)



Scille (*Urginea maritima*, syn.: *Urginea indica* - LILIACEAE), bulbe : source de procillaridine, cardiotonique, diurétique, expectorant, TOXIQUE



Sénés, (*Cassia senna* et *Cassia angustifolia* - CAESALPINIACEAE), feuilles (folioles) : laxatif



Séné (*Cassia senna* et *Cassia angustifolia* - CAESALPINIACEAE) fruit : gousse
: laxatif



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri, Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Serpolet (*Thymus serpyllum* – LAMIACEAE) Feuille+fleur : Stomachique, Digestif, Décongestionnant (nez bouché, rhume)



Thapsia (*Thapsia garnica* – APIACEAE) : jus des parties souter., antirhumatismale,
TOXIQUE (Allergie de contact, Dermatite)



Tilleuls, (*Tillia europaea*, *Tillia tomentosa*, *Tillia cordata*, *Tillia platiphyllus*, **TILLIACEAE**), inflorescence et bractées, aubuer, bourgeons : sédatif, antispasmodique, dyspeptie, spasmolytique (digestif, hépatique, urinaire)



Verveine odorante, (*Aloysia triphylla* syn.: *Lippia citriodora*, VERBENACEAE),
feuilles : sédatif léger, antidyspeptique



UNIVERSITE
UMC
MENTOURI
CONSTANTINE

Abdelmalik Belkhiri, Farid Dalia., © 2012-13
Email : belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr
Laboratoire de Pharmacognosie
Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UMC

Support pédagogique destiné aux enseignements de
Pharmacognosie. La reproduction de ce document sans
autorisation du concepteur, constitue une contrefaçon.

Zygophylle cornu (*Zygophyllum cornutum*, ZYGOPHYLLACEAE), partie aérienne
fleurie : hypoglycémiant, cicatrisant externe

